

เต้าร้างแดง



ชื่อวิทยาศาสตร์	: <i>Caryota mitis</i> Lour.
ชื่อสามัญ	: -
ชื่อวงศ์	: -
ชื่ออื่น	: เต้าร้าง เชียงใหม่



ลักษณะทางพฤกษศาสตร์

เป็นปาล์มแตกกอ ขนาดกลาง เส้นผ่าศูนย์กลางลำต้น 10–15 เซนติเมตร สูง 7-10 เมตร ลำต้นสีเขียว ใบเป็นใบประกอบแบบขนนกสองชั้น (bipinnate) กาบใบยาว 50–150 เซนติเมตร ขอบกาบใบมีรกรเป็นเส้นใยสีดำห่อหุ้มลำต้น ก้านใบยาว 50-100 เซนติเมตร แกนกลางใบยาว 2–4 เมตร กาบใบ ก้านใบ และแกนกลางใบมีขนละเอียดสีน้ำตาลปกคลุม ใบย่อยรูปสามเหลี่ยมหักแฉ่ ปลายแหลมคล้ายหางปลา (fish tail) ใบย่อยคู่ปลายใหญ่สุดรูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน ช่อดอกห้อยลงออกจากบริเวณชอกกาบใบใกล้ยอดลงสู่โคน เมื่อออกดอกถึงโคนก็จะตายไป ช่อดอกยาว 60-100 เซนติเมตร ก้านชูช่อดอกยาว 30–45 เซนติเมตร ช่อดอกเป็นช่อแยกแขนงมีก้านช่อย่อยหลายอัน ผลเกือบกลม ขนาด 0.8–1.3 x 1-2 เซนติเมตร ติดเรียงเวียนรอบก้านช่อดอกจำนวนมาก ผลอ่อนสีเขียว ผลสุกสีดำ มี 1 เมล็ด น้ำจากผลถูกผิวหนังจะคัน

แหล่งที่พบ : พบทั้งในที่ร่มและที่แจ้ง บริเวณป่าชายหาด ป่าพรุ ป่าดิบชื้น และพื้นที่การเกษตร ตั้งแต่ระดับน้ำทะเลไปจนถึงระดับความสูงประมาณ 800 เมตรจากระดับน้ำทะเลปานกลาง