

กะป้อ

ชื่อวิทยาศาสตร์	: <i>Licuala spinosa</i> Thunb.
ชื่อสามัญ	: -
ชื่อวงศ์	: -
ชื่ออื่น	: กะป้อหนาม กะป้อเขี้ยว



ลักษณะทางพฤกษศาสตร์

เป็นปาล์มแตกกอ ขนาดเล็กถึงขนาดกลาง เส้นผ่าศูนย์กลาง ลำต้น 4-6 เซนติเมตร สูง 3-5 เมตร รอยวงแหวนไม่ชัด ลำต้นบางส่วนปกคลุมด้วยกาบใบแห้ง ใบรูปฝ่ามือ ประมาณ ? ของวงกลม ขอบกาบใบมีรูกเป็นเส้นใยสีน้ำตาลหุ้ม ลำต้น และมีเส้นใบยาว 30-50 เซนติเมตร ก้านใบยาว 1.5-3 เมตร ที่ขอบมีหนามรูปสามเหลี่ยมตลอดก้าน ใบย่อย ขนาด 40-70 x 4 - 15 เซนติเมตร ใบย่อยจักเว้าลึกถึงสะดือ มีใบย่อย 15-25 ใบขนาดใกล้เคียงกัน ปลายใบหยักเป็นซี่ ช่อดอก ออกบริเวณซอกกาบใบ ยาว 2-3 เมตร มี 7-10 แขนง แต่ละแขนงมี 3-5 ช่อย่อย ออกดอกประมาณเดือนมกราคม – มิถุนายน ผลกลม ขนาด 0.8 เซนติเมตร ผลอ่อนสีเขียว ผลสุกสีแดง มี 1 เมล็ด

แหล่งที่พบ : พบทั่วไปบริเวณป่าชายหาด ริมป่าพรุ และพื้นที่การเกษตร ทั้งในที่รุ่ม และที่ โโล่ง ตั้งแต่ระดับน้ำทะเล -150 เมตร จากระดับน้ำทะเลปานกลาง

