

จาก

ชื่อวิทยาศาสตร์	: <i>Nypa fruticans</i> Wurmb.
ชื่อสามัญ	: -
ชื่อวงศ์	: -
ชื่ออื่น	: อัดติ๊ะ



ลักษณะทางพฤกษศาสตร์

เป็นปาล์มแตกกอออกจากลำต้นที่เลื้อยไปตามพื้นดินหรือใต้ดิน เส้นผ่าศูนย์กลางลำต้น 30-60 เซนติเมตร กาบใบอวบแผ่ขยายออกคลุมโคนต้น ก้านใบสีดำอวบอ้วน ยาว 50-100 เซนติเมตร ทางใบตั้งขึ้น ยาว 5-9 เมตร มีใบย่อยรูปร่างน้ำควา ขนาด 100-150 x 5-8 เซนติเมตร จำนวน 60-100 คู่เรียงเป็นระเบียบสม่ำเสมอ ช่อดอก ออกบริเวณซอกกาบใบ ช่อดอกตั้งขึ้น ยาว 1-2 เมตร ดอกเพศผู้ และดอกเพศเมียอยู่บนช่อเดียวกัน ดอกเพศเมียจะอยู่ที่ปลายช่อดอก รวมกันเป็นกระจุกกลมขนาดด้วยช่อดอกเพศผู้ ผลรวมเป็นกลุ่มกลม ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 30-45 เซนติเมตร มีผลย่อยจำนวนมาก ผลย่อยรูปไข่กลับ (obovoid) ขนาด 10-15 x 7-10 เซนติเมตร สีน้ำตาล

แหล่งที่พบ : พบบริเวณป่าชายเลน และริมคลองที่มีน้ำกร่อย